සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි]
All Rights Reserved)

18079

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව/Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 1992 අගෝස්තු
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 1992

(02) ව්‍යවහාරික ගණිතය I (02) Applied Mathematics I	02	
	S	I

පැ තුනයි / *Three hours*

ප්‍රශ්න හයකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

1. O ලක්ෂ්‍යයක් අනුබද්ධයෙන් A, B සහ C ප්‍රභින්න ලක්ෂ්‍ය තුනේ පිහිටුම් දෛශික පිළිවෙලින් $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ යහ $\alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b}$ වෙයි. $\alpha + \beta = 1$ ම නම් පමණක් A, B සහ C ඒකරේඛීය බව සාධනය කරන්න.

OPQ යනු ත්‍රිකෝණයකි; $\overrightarrow{OP} = \mathbf{p}$, $\overrightarrow{OQ} = \mathbf{q}$. A යනු $\frac{PA}{QA} = \lambda\ (>1)$ වන පරිදි දික් කළ PQ පාදය මත පිහිටි ලක්ෂ්‍යයෙකි; B, C යනු $\frac{OB}{BP} = \gamma\ (>0)$ ද $\frac{QC}{CO} = \mu\ (>0)$ ද වන පරිදි පිළිවෙලින් OP ත් OQ ත් පාද මත පිහිටි ලක්ෂ්‍ය යි.

$\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$ ද $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$ ද $\overrightarrow{OC} = \mathbf{c}$ ද නම් $\mu\gamma\ (1-\lambda)\,\mathbf{a} - \mu\ (1+\gamma)\,\mathbf{b} + (1+\mu)\,\mathbf{c} = (1-\lambda\mu\gamma)\,\mathbf{q}$ බව පෙන්වන්න.

ඒ නයින්, $\lambda\mu\gamma = 1$ ම නම් පමණක් A, B, C ඒකරේඛීය බව අපෝහනය කරන්න.

2. $\mathbf{a}$ හා $\mathbf{b}$ නිශ්-ශූන්‍ය දෛශික දෙකේ $\mathbf{a}.\mathbf{b}$ අදිශ ගුණිතය අර්ථ දක්වන්න.

(අ) පහත සඳහන් එක් එක් අවස්ථාවේ දී $\mathbf{a}$ ත් $\mathbf{b}$ ත් අතර කෝණය සොයන්න:

(i) $\mathbf{a}.(\mathbf{a}-\mathbf{b}) = 0$ සහ $|\mathbf{b}| = 2|\mathbf{a}|$

(ii) $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = |\mathbf{a}+\mathbf{b}|$

(ආ) A, B, C, D යනු චතුස්තලයක ශීර්ෂ වෙයි. AD ට BC ලම්බ නම් ද BD ට CA ලම්බ නම් ද CD ට AB ලම්බ බව පෙන්වන්න.

[අනෙක් පිට බලන්න

3. $\mathbf{a}$ හා $\mathbf{b}$ නිශ්-ශූන්‍ය දෛශික දෙකේ $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ දෛශික ගුණිතය අර්ථ දක්වන්න.

$Oxyz$ යනු සුරත් සෘජුකෝණාස්‍ර කාටීසිය ඛණ්ඩාංක පද්ධතියකි. $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ යනු පිළිවෙලින් Ox, Oy, Oz අක්ෂවල ධන දිශා ඔස්සේ වන ඒකක දෛශික යි.

(i) $\mathbf{j} \times \mathbf{k}$ හා $\mathbf{k}$ දෛශිකවල එම අනුපිළිවෙල අනුව දෛශික ගුණිතය, සොයන්න.

(ii) $\overrightarrow{AC} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ ත් $\overrightarrow{BD} = \mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$ ත් විකර්ණ ලෙස ඇති $ABCD$ සමාන්තරාස්‍රයේ වර්ගඵලය වර්ග ඒකක $\sqrt{42}$ බව පෙන්වන්න.

(iii) O මූල ලක්ෂ්‍යය අනුබද්ධයෙන් P නම් ලක්ෂ්‍යයෙක පිහිටුම් දෛශිකය $\mathbf{p} = \overrightarrow{OP} = x\,\mathbf{i} + y\,\mathbf{j} + z\,\mathbf{k}$ වෙයි නම්, Q ලක්ෂ්‍යයේ $\mathbf{q}$ පිහිටුම් දෛශිකය, $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ හා $\mathbf{k}$ ඇසුරින් සොයන්න. මෙහි,

$\mathbf{q} = \overrightarrow{OQ} = \mathbf{k} \times \mathbf{p}$ වෙයි.

තව ද, $\mathbf{p} \times \mathbf{q} = \mathbf{k}$ නම්, $z = 0$ තලය මත වන $x^2 + y^2 = 1$ වෘත්තය මත P ලක්ෂ්‍යය පිහිටන බව පෙන්වන්න.

4. බර W වූ AB දණ්ඩක්, අරය r ද, කේන්ද්‍රය C ද වූ සුමට අචල අර්ධ ගෝලාකාර පාත්‍රයක් තුළ **සම්පූර්ණයෙන්** ම පිහිටන පරිදි, නිශ්චල ව පිහිටා ඇත. AB දණ්ඩේ G ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මඟින් දණ්ඩ a හා b කොටස් දෙකට බෙදී තිබෙයි. මෙහි $b > a$ ද $r > \sqrt{ab}$ ද වෙයි. සමතුලිතා පිහිටීමේ දී නිරසට දණ්ඩේ ආනතිය θ නම්,

$\sin\theta = \dfrac{b-a}{2\sqrt{r^2-ab}}$ බවත් $CG = \sqrt{r^2-ab}$ බවත් පෙන්වන්න.

පාත්‍රයත් දණ්ඩත් අතර ප්‍රතික්‍රියා සොයන්න.

5. A නම් ලක්ෂ්‍යයක් වටා, විශාලත්වයෙන්, දිශාවෙන් හා ක්‍රියා රේඛාවෙන් $\overrightarrow{BC}$ මඟින් නිරූපණය කැරෙන බලයෙක සුරණයේ විශාලත්වය, ABC ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය මෙන් දෙගුණයක් බව සාධනය කරන්න.

$ABCD$ යනු ත්‍රපීසියමකි; එහි AD හා BC සමාන්තර ද, E, F යනු පිළිවෙලින් AD හා BC පාදවල මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ද වෙයි.

විශාලත්වයෙන්, දිශාවෙන් හා ක්‍රියා රේඛාවෙන් $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{DA}$, $\overrightarrow{AC}$ හා $\overrightarrow{DB}$ මඟින් නිරූපණය කැරෙන බල හයකින් පද්ධතියක් සමත්විත වෙයි. P යනු දික් කළ DA මත පිහිටි ලක්ෂ්‍යයක් නම්, P වටා පද්ධතියේ සුරණයේ විශාලත්වය

$$\frac{4 \mid AP - BF \mid S}{AD + BC}$$

බව පෙන්වන්න. මෙහි S යනු $ABCD$ ත්‍රපීසියමේ වර්ගඵලය යි.

පද්ධතියේ සම්ප්‍රයුක්ත බලයත් එහි ක්‍රියා රේඛාවට AD හමු වන පිහිටීමත් සොයන්න.

6. එක එකක බර W වන AB හා BC සමාන ඒකාකාර දඬු දෙකක් B හි දී නිදහස් ලෙස සන්ධි කර තිබෙයි. ඒවායේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ඇදහු ලැබූ අප්‍රත්‍යාස්ථ තන්තුවේ දිග කොතෙක් ද යත් එය නොවැක් ව ඇති විට ABC කෝණය සෘජුකෝණයක් වන පරිදි ය. පද්ධතිය නිදහස් ලෙස A ලක්ෂ්‍යයෙන් එල්ලා ඇති නම් ද එය සමතුලිතතා පිහිටීමේ තිබෙයි නම් ද සිරසට AB ගේ ආනතිය $\tan^{-1}(\frac{1}{2})$ බවත් තන්තුවේ ආතතිය $\dfrac{3W}{\sqrt{5}}$ බවත් පෙන්වන්න.

BC දණ්ඩ මත B සන්ධියේ ප්‍රතික්‍රියාව BC ඔස්සේ ක්‍රියා කරන බව ද පෙන්වන්න.


7. අරය a ද, O කේන්ද්‍රයේ දී රේඩියන් 2θ කෝණයක් ආපාතනය කරන්නා වූ ද, ACB ඒකාකාර වෘත්ත චාපයක G ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය OC මධ්‍ය අරය මත පිහිටන බවත් $OG = a\left(\frac{\sin\theta}{\theta}\right)$ බවත් පෙන්වන්න.

එක ම ඒකාකාර කම්බියෙන් ලබා ගත් එහෙත් වෙනස් අර සහිත වෘත්තාකාර කැබැලි දෙකක් අතුරෙන් එකකින් S_1 අර්ධ වෘත්තයක් ද, අනෙකින් කේන්ද්‍රයේ දී රේඩියන් 2θ $(<\pi)$ කෝණයක් ආපාතනය කැරෙන S_2 වෘත්ත චාපයක් ද එකට තබා ඇත්තේ ළසදක් (crescent) සැදෙන පරිදි ය. θ කෝණය කෙසේ ද යත් ළසදෙහි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය S_2 ඇතුළු චාපය මත පිහිටන පරිදි වෙයි නම්,

$$\sin^2\theta - \left(\tfrac{\pi}{2} - 1\right)\sin\theta + \tfrac{\pi}{2}\sin 2\theta = \theta$$

බව සාධනය කරන්න.

8.



A, B, C, D, E, ලක්ෂ්‍යවල දී සුවල ලෙස සන්ධි කළ සමාන දුහු දඬු හතකින් සමන්විත රාමු සැකිල්ලක් ඉහත රූපයෙන් නිරූපණය වෙයි. $C, D,$ හා E ලක්ෂ්‍යවල දී පිළිවෙළින් 20 kg, 20 kg හා 10 kg භාර තුන රාමු සැකිල්ල දරා සිටියි. රාමු සැකිල්ල, A අවල ලක්ෂ්‍යයට, නිදහස් ලෙස අසවූ කර තිබෙයි. C ලක්ෂ්‍යයට යෙදූ F තිරස් බලයක් මඟින් CDE තිරස් ව තබා ඇත. F සොයන්න. A හි ප්‍රතික්‍රියාවේ තිරස් සංරචකයත් සිරස් සංරචකයත් සොයන්න.

ප්‍රත්‍යාබල රූප සටහනක් ඇඳ, ඒ නයින් දඬුවල ඇත්තේ ආතති ද තෙරපුම් ද යන්න සඳහන් කරමින් දඬු සියල්ලේ ම ප්‍රත්‍යාබල සොයන්න.

9. බර W ද, දිග $2a$ ද, වන ඒකාකාර ඉණිමගක්, එහි එක් කෙළවරක් සුමට සිරස් බිත්තියකටත් අනෙක් කෙළවර, සර්ෂණ සංගුණකය μ වූ රළු පොළොවකටත් හේත්තු වන සේ තබා තිබෙයි. ඉණිමගේ බර මෙන් සිව් ගුණයක් බර මිනිසකුට, එය ලිස්සා යන්නේ නැති ව ඉණිමගේ මුළු දිග ම නැගීමට පුළුවන. සුමට කෙළවරේ දී යටියත් සිරස සමඟ ඉණිමගේ ආනතිය θ නම්, පද්ධතියේ **සාධාරණ සමතුලිතතා පිහිටීමක්** සැලකීමෙන්,

$$\mu \geqslant \tfrac{9}{10}\tan\theta$$

බව පෙන්වන්න.

දැන්, ඉණිමගේ අඩිය බිත්තියේ සිට $a\sqrt{2}$ දුරකින් වෙයි නම් ද, $\mu \leqslant \frac{1}{2}$ නම් ද, ඉණිමග ලිස්සන්නේ නැති ව මිනිසාට නැවතත් ඉණිමගේ මුළු දුර ම නැගීමට හැකි වන පරිදි දණ්ඩ තරහා යන සිරස් තලයේ යෙදිය යුතු යුග්මයේ අවම අගය සොයන්න.

[අනෙක් පිට බලන්න.

10. (අ) ABC ත්‍රිකෝණික ආස්තරය, සමජාතීය ද්‍රව්‍යයක ගිල්වා ඇත්තේ එහි තලය සිරස් ව ද, BC පාදය නිදහස් පෘෂ්ඨයේ ද පිහිටන පරිදි ය. h යනු A හි ගැඹුර විට පිඩන කේන්ද්‍රයේ ගැඹුර $\frac{h}{2}$ බව අනුකලනයෙන් හෝ අන් අයුරෙකින් හෝ පෙන්වන්න.

(ආ) ABC ත්‍රිකෝණික ආස්තරයක්, ඒකාකාර ඝනත්වයෙන් යුත් ද්‍රව්‍යයෙක සිරස් ලෙස ගිල්වා ඇත්තේ, එහි A ශීර්ෂය නිදහස් පෘෂ්ඨයේ ද B ශීර්ෂය, නිදහස් පෘෂ්ඨයට පහළින් a ගැඹුරකින් ද C ශීර්ෂය, නිදහස් පෘෂ්ඨයට පහළින් b $(\geqslant a)$ ගැඹුරකින් ද පවතින පරිදි ය. එහි පිඩන කේන්ද්‍රය නිදහස් පෘෂ්ඨයේ සිට,

$$\frac{a^2 + ab + b^2}{2(a + b)}$$

ගැඹුරකින් පිහිටන බව පෙන්වන්න.

11. සිරස් කෝණය 2α වන සන සෘජු වෘත්ත කේතුවක් සම්පූර්ණයෙන්ම ජලයේ ගිල්වා ඇත්තේ එක් ජනකයක් ජලය, පෘෂ්ඨයේ කිඛෙන ලෙස ය. කේතුවේ වක්‍ර පෘෂ්ඨය මත සම්ප්‍රයුක්ත තෙරපුම්,

$$W\sqrt{1 + 3\sin^2\alpha}$$

බව සාධනය කරන්න. මෙහි W යනු කේතුවෙන් විස්ථාපනය වුණු ජලයේ බර යි.

එම සම්ප්‍රයුක්ත තෙරපුම්, කේතුවේ අක්ෂයට $\cot^{-1}(2\tan\alpha)$ කෝණයෙකින් ආනත බව ද සාධනය කරන්න.

12. අරය a ද කේන්ද්‍රය O ද ස්කන්ධය M ද වන ඒකාකාර තොවන ගෝලයක්, එහි පෘෂ්ඨය මත ඇති P ලක්ෂ්‍යයකට ඇදූ දුනු තන්තුවක් මඟින් ඵල්ලා කිඛෙයි. විශාල වැංකියක වූ ρ ඒකාකාර ඝනත්වයෙන් යුත් නිශ්චලතාවේ පවතින ද්‍රව්‍යයක, ගෝලය අඩක් ගිල්වා ඇත. සමතුලිතතා පිහිටීමේ දී තන්තුවේ ආනතිය T (>0) වෙයි. O කේන්ද්‍රයේ සිට c දුරකින් ගෝලයේ G ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිහිටා ඇත. GP මඟින් O හි දී θ කෝණයක් ආපාතනය කැරෙයි. නිදහස් ද්‍රව පෘෂ්ඨයේ සිට h ගැඹුරකින් O කේන්ද්‍රය පිහිටයි නම් ද OG, උඩු සිරස සමඟ α කෝණයක් සාදයි නම්, ද ද්‍රව්‍ය හේතු කොට ගෙන ගෝලය මත ඇති කැරෙන උඩු-තෙරපුමේ විශාලත්වයත් ක්‍රියා රේඛාවත් සොයන්න.

ඒ නයින්, සමතුලිතතා පිහිටීමේ දී,

(i) $U = \frac{\pi\rho g}{3}(a + h)^2(2a - h)$ විට $T = Mg - U$ බවත්,

(ii) $\alpha = \tan^{-1}\left[\frac{T\sin\theta}{T\cos\theta - \frac{Mgc}{a}}\right]$ බවත්

පෙන්වන්න.

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි]
All Rights Reserved]

18079

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව/Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 1992 අගෝස්තු
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 1992

(02) ව්‍යවහාරික ගණිතය II (02) Applied Mathematics II	02	
	S	II

පැ තුනයි/*Three hours*

ප්‍රශ්න හයකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

1. (i) $e^y\left(\frac{dy}{dx}+1\right) = 1$ අවකල සමීකරණය විසඳන්න.

(ii) v යනු x හි ශ්‍රිතයක් විට $y = vx$ යන්න

$$2x^2\frac{dy}{dx} + y^2 = x(x+2y)$$

අවකල සමීකරණය සපුරාලයි නම් $v(x-c) = x+c$ බව පෙන්වන්න. මෙහි c යනු අඛණ්ඩ නියතයකි.

(iii) xOy තලයේ වක්‍රයක් කෙසේ ද යත් $P(x, y)$ ලක්ෂ්‍යයේ දී වක්‍රයේ අභිලම්බය Mහි දී x- අක්ෂයත් Nහි දී y - අක්ෂයත් ඡේදනය වන අතර $MP = PN$ වන පරිදි වෙයි. තව ද වක්‍රය $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ලක්ෂ්‍යය හරහා යන බව දී තිබෙයි. වක්‍රයේ සමීකරණය සොයන්න.

2. f නියත ත්වරණයෙකින් සෘජු රේල් පාරක ගමන් කරන l දිගැති දුම්රියකට $2V$ උපරිම වේගයක් ඇත. රේල් පාරට සමාන්තර පාරක, දුම්රිය යන දිශාවට ම ගමන් කරන මෝටර් රථයකට $2f$ නියත ත්වරණයකුත් $3V$ උපරිම වේගයකුත් තිබේ. ආරම්භයේ දී දුම්රියේ පසු පස කෙළවරත් මෝටර් රථයේ ඉදිරි පසත් එක රේඛාවේ වන අතර දුම්රියේත් මෝටර් රථයේත් වේග පිළිවෙළින් V හා $\frac{1}{2}V$ වෙයි. දුම්රියත් මෝටර් රථයත් ඒවායේ උපරිම වේග ලබා ගන්නේ පිළිවෙලින් t_1 හා t_2 කාලවල දී ය. දුම්රියේ ඉදිරි පස හා මෝටර් රියේ ඉදිරි පස එක රේඛාවේ පිහිටන්නේ t_3 $(> t_2)$ කාලයේ දී ය. දුම්රියේ චලිතයත් මෝටර් රථයේ චලිතයත් සඳහා ප්‍රවේග කාල වක්‍ර එක ම රූප සටහනක අඳින්න. ඒ නයින්, දුම්රියේ පසු පස කෙළවර, යළින් වරක් t_1 කාලයේ දී මෝටර් රථයේ ඉදිරි පස සමඟ එක රේඛාවේ පිහිටන බව අපෝහනය කරන්න.

$$t_3 = \frac{l}{V} + \frac{17V}{16f} \quad \text{බවත්}$$

$$3V^2 < 16fl \quad \text{බවත්}$$

පෙන්වන්න.

3. සමතල රේල් පාරක ගමන් කරන, ස්කන්ධය කපා හැර ඇති දුම්රියක මන්දනය $k(v^2 + U^2)$ වෙයි. මෙහි v යනු වේගය ද k හා U යනු නියත ද වෙයි. ආරම්භයේ දී $v = 2U$ නම්, $\frac{1}{Uk}\tan^{-1}(\frac{1}{3})$ කාලයේ දී $\frac{1}{2k}\log_e\frac{5}{2}$ දුරක දී එහි වේගය අඩක් වන බව සාධනය කරන්න.

දැන්නර $\frac{\pi}{4Uk}$ කාලයෙක දී තවත් $\frac{1}{2k}\log_e 2$ දුරක් ගමන් කළ පසු දුම්රිය නිශ්චලතාවට පැමිණෙන බව ද සාධනය කරන්න.


අනෙක් පිට බලන්න.

4. නොවැ u උපරිම වේගයක් සහිත Q නම් තොර බඩු බෝට්ටුවක් A පිහිටීමේ තිබෙයි. A ට දකුණු දෙසින් නැව් සැතැප්ම a දුරකින් වූ P මුර සංචාරක බෝට්ටුවක් නොවැ v $(>u)$ නියත ප්‍රවේගයෙකින් උතුරු දෙසට යාත්‍රා කරන බව ආරංචි විය. P හි ගමන් මග වෙනස් නොකළහොත්, P හේ ගමන් මගට හැකි තාක් ඇතින් සිටීම සඳහා Q යාත්‍රා කළ යුතු දිශාව සොයන්න. මේ අවස්ථාවේ දී ඒවා අතර කෙටි ම දුර කොපමණ ද ?

තවත් අවස්ථාවක දී, v ප්‍රවේගයෙන් උතුරට ගමන් කරන P මුර සංචාරක බෝට්ටුව විසින්, නැව් සැතැප්ම b බටහිරින් පිහිටි Q තොර බඩු බෝට්ටුව, නොවැ $\sqrt{v^2 - u^2}$ ප්‍රවේගයෙකින් නැගෙනහිරින් දකුණට $\cos^{-1}\left(\frac{u}{v}\right)$ කෝණයක් සාදන දිශාවට යාත්‍රා කරනු දක්නා ලදී. ඇත්ත වශයෙන් ම Q බෝට්ටුව එහි u උපරිම වේගයෙන් ගමන් කරන බව පෙන්වන්න. එහි වලිතයේ දිශාව සොයන්න.

දැන් Q බෝට්ටුව තම ගමන් මාර්ගය වෙනස් නො කළහොත්, එය අල්ලා ගැනීම සඳහා, බටහිරින් උතුරට $\sin^{-1}\left(\frac{u^2}{v^2}\right)$ කෝණයක් සාදන දිශාවට P බෝට්ටුව ගමන් කළ යුතු බවත් පැය $\frac{bv}{\sqrt{v^2 - u^2}\,[\,u + \sqrt{u^2 + v^2}\,]}$ කාලයකට පසු අල්ලා ගැනීම සිදු වන බවත් පෙන්වන්න.

5. α ආනතියෙන් යුත් සුමට කුඤ්ඤයක් සුමට තිරස් මේසයක් මත තබා තිබෙයි. දෙ කෙළෙවිරට m හා m' $(m > m')$ ස්කන්ධ ඇදූ $2l$ දිගැති ලුහු අවිතතය තන්තුවක්, කුඤ්ඤයේ ඉහළ ආනත මුහුණතින් නෙරා තිබෙන කුඩා සුමට P නාදන්නක් වටා යවා ඇත. අංශු, කුඤ්ඤයේ මුහුණත සමඟ ස්පර්ශ වෙමින් පවතියි. ආරම්භයේ දී, අංශු එකක් අනෙකට ආසන්නව ද නාදන්නේ සිට l දුරකින් පිහිටන පරිදි ද තබා තිබෙයි. තන්තුවේ එක් එක් කොටස තොබුරුල් ව ද ආනත මුහුණතේ උපරිම බැවුම් රේඛාවක ද පිහිටා ඇත. බරින් අඩු m' අංශුව P නාදන්න වෙතට ඒමට පෙර කුඤ්ඤයේ ත්වරණය.



$$\frac{(m - m')^2\, g \sin\alpha \cos\alpha}{M(m + m') + 4mm' + (m - m')^2 \sin^2\alpha}$$

බව සාධනය කරන්න. මෙහි M යනු කුඤ්ඤයේ ස්කන්ධය යි. (P නාදන්නේ සිට කුඤ්ඤයේ පහළ දරය තෙක් දුර $2l$ ට වැඩි බව උපකල්පන කළ යුතු ය.)

බරින් අඩු අංශුව නාදන්න වෙත පැමිණෙන විට කුඤ්ඤය $\frac{l(m - m')\cos\alpha}{M + m + m'}$ දුරක් මේසය මත ගමන් කර ඇති බව අපෝහනය කරන්න.

6. එන්ජිමක්, 40 000 N ක නියත ප්‍රතිරෝධයකට එරෙහි ව සමතල රේල් පාරක 10 m s^{-1} සතත වේගයකින් ගමන් කරයි. එන්ජිමේ ජව ප්‍රතිදානය, kW වලින් ගණනය කරන්න.

ඊ ළඟට එන්ජිම, සබැඳුම් දණ්ඩක් මඟින් දුම්රිය මැදිරියකට ඇදන ලදී. මැදිරියේ වලිතයට නියත ප්‍රතිරෝධය 20 000 N කි. දැන් එන්ජිමේ ජව ප්‍රතිදානය 900 kW නම්, සමතල රේල් පාරක දුම්රියේ උපරිම වේගය m s^{-1} වලින් ගණනය කරන්න.

මේ අවස්ථාවේ දී, සබැඳුම් දණ්ඩේ ආතතිය නිව්ටන්වලින් කොපමණ ද?

පසු ව, දුම්රිය ඉහත ජව ප්‍රතිදානය ම, එනම් 900 kW ඇති ව එම නියත සර්ෂණ බලවලට එරෙහි ව තිරසට $\sin^{-1}(\frac{1}{20})$ ආනතියක් සහිත බැවුමක් ඉහළට යයි. දුම්රියේ මුළු ස්කන්ධය මෙට්‍රික් ටොන් 340 ක් නම්,

(i) 5 m s^{-1} වේගයෙන් බැවුම ඉහළට යන විට දුම්රියේ ත්වරණය $\frac{1}{17}$ m s^{-2} බවත්,

(ii) බැවුම ඉහළට දුම්රියේ උපරිම වේගය 7 m s^{-1} ට යමතම් වැඩි බවත්

පෙන්වන්න.

(ගුරුත්වජ ත්වරණය, g යන්න 10 m s^{-2} ලෙස ද, මෙට්‍රික් ටොනය, 1000 kg ට සමාන ලෙස ද ගන්න.)

7. A අභ්‍යාසනය, තිරස සමඟ α $\left(\neq \frac{\pi}{2}\right)$ කෝණයක් සාදන සරල රේඛාවක් ඔස්සේ U ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ඉහළ නඟියි. අභ්‍යාසනය, පොළොවේ වූ අභ්‍යාසනා නාශක කුවක්කුවකට තිරස් ලෙස ඉහළින් h උසකින් පියාසර කරන මොහොතක දී V ප්‍රවේගයෙන් තිරස සමඟ θ කෝණයක් සාදන දිශාවකට කුවක්කුවෙන් S වෙඩිල්ලක් තබනු ලැබෙයි. වෙඩිල්ල අභ්‍යාසනයේ වැදුනොත්, A ට සාපේක්ෂ ව S හි පෙත සැලකීමෙන් හෝ අන් අයුරකින් හෝ

(i) $V^2 > U^2 [1 + k^2 + 2k \sin \alpha]$ බවත්

(ii) $\tan \theta > k \sec \alpha + \tan \alpha$ බවත් පෙන්වන්න. මෙහි $k = \frac{\sqrt{2gh}}{U}$

$k > 1$ නම්, $\theta > \cos^{-1}\left(\frac{U}{\sqrt{2gh}}\right)$ බව අපෝහනය කරන්න.

8. A, B හා C යන අංශු තුනේ ස්කන්ධ පිළිවෙලින් m, $2m$ හා $2m$ වෙයි. AB හා AC ලුහු අවිතනය තන්තු මඟින් A අංශුව B වත් C වත් ඇදා තිබෙයි. තන්තු නොබුරුල්ව ද BAC කෝණය $= 60°$ ද වන සේ පද්ධතිය සුමට තිරස් තලයක් මත තබා ඇත. $\overrightarrow{BA}$ දිශාවට A අංශුවට I ආවේගයක් යොදනු ලැබෙයි. අංශුවල ආරම්භක ප්‍රවේග සොයන්න. $\overrightarrow{BA}$ සමඟ $\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{5}\right)$ කෝණයක් සාදන දිශාවකට A අංශුව චලනය වීමට පටන් ගන්නා බව පෙන්වන්න.

පද්ධතියට යොදන ලද වාලක ශක්තිය, m හා I ඇසුරෙන් සොයන්න.

9. එක හා සමාන සුමට කේවල ප්‍රත්‍යාස්ථ ගෝල දෙකක්, ඇල ව සවිටනය වෙයි ; ආරම්භයේ දී එක් ගෝලයක් නිශ්චලතාවේ පවතියි. සවිටනයෙන් පසු ඒවායේ පෙත් **සෘජුකෝණි** වන බව පෙන්වන්න.

එක එකක් 3 cm අරයෙන් යුත් ඒ වැනි S_1, S_2 ගෝල දෙකක කේන්ද්‍ර පිළිවෙලින් A, B ලක්ෂ්‍යවල වෙයි. මෙහි $AB = 16$ cm. ඒ හා සමාන තෙ වැනි S_3 ගෝලයක් AB ට සෘජුකෝණි ලෙස ප්‍රක්ෂේප කරන ලද්දේ පළමුවෙන් ම S_1 සමඟ ද ඊ ළඟට S_2 සමඟ ද ගැටෙන පරිදි ය. පළමු වැනි හා දෙ වැනි සවිටනවල දී S_3 හි කේන්ද්‍රය පිළිවෙලින් C හා C' ලක්ෂ්‍යවල පිහිටයි. S_3 ගේ චලිතයේ අවසාන දිශාව ද AB ට සෘජුකෝණි ලෙස වෙයි. CC' දුර සොයන්න. S_1, S_2, S_3 ගෝලවල අවසාන වේග $20 : 12 : 9$ අනුපාතයෙන් වන බව පෙන්වන්න.

10. (අ) P ලක්ෂ්‍යයක්, xOy තලයේ චලනය වන්නේ කෙසේ ද යත් t කාලයෙක දී එහි පිහිටුම් දෛශිකය $\overrightarrow{OP} = (a \cos \omega t)\,\mathbf{i} + (a \sin \omega t)\,\mathbf{j}$ වන පරිදි ය. මෙහි a, ω යනු නියත ද $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ යනු පිළිවෙලින් Ox, Oy අක්ෂ ඔස්සේ වූ ඒකක දෛශික ද වෙයි. P ගේ පෙත වෘත්තයක් බව පෙන්වන්න. P ගේ ප්‍රවේගයේත් ත්වරණයේත් විශාලත්වය හා දිශාව සොයන්න.

තව ද, N යනු P සිට Ox අක්ෂයට ඇඳි ලම්බයේ අඩිය නම්, N සරල අනුවර්ති චලිතයෙක යෙදෙන බවත් එහි ආරම්භක පිහිටීමේ ($t = 0$) සිට $\hat{PON}$ = රේඩියන් α වන පරිදි වූ පිහිටීම නෙක් ගත වන කාලය $\frac{\alpha}{\omega}$ බවත් පෙන්වන්න.

(ආ) පෘථිවි පෘෂ්ඨය තුළ වූ වස්තුවක්, එහි සිට පෘථිවි කේන්ද්‍රයට ඇති දුරට අනුලෝම වශයෙන් සමානුපාතික බලයකින්, පෘථිවියේ කේන්ද්‍රය දෙසට ආකර්ෂණය වන්නේ යැයි උපකල්පනය කරමින්, වස්තුවක් පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ සිට 32 km ගැඹුරු සිරස් වළක පතුළට වැටීමට ගත වන කාලය සඳහා සංඛ්‍යාත්මක ප්‍රකාශනයක් සොයන්න. (පෘථිවියේ අරය $= 6400$ km ලෙස ද ගුරුත්වජ ත්වරණය $g = 10$ m s^{-2} ලෙස ද ගන්න.)

[අනෙක් පිට බලන්න.

11. සුමට පටු තිරස් බටයක්, කේන්ද්‍රය O ද, අරය a ද වූ වෘත්තයෙක නැඩයට තමා එහි තලය සිරස් ව තිබෙන සේ සවි කර ඇත. පිළිවෙලින් ඒකක ස්කන්ධය m හා km වන P හා Q අංශු දෙක, $\frac{\pi a}{2}$ දිගැති ලුහු අවිතන්‍ය තන්තුවක් මඟින් ඇදා බටය තුළ තබා ඇත්තේ O ට සිරස් ලෙස ඉහළින් P ද O හා එක ම මට්ටමක Q ද පිහිටන පරිදි ය. තන්තුව බටය තුළ වෙයි. $t = 0$ කාලයේ දී පද්ධතිය නිශ්චලතාවේ සිට මුදා හරිනු ලැබෙයි. t කාලයෙක දී OP, උඩු සිරස සමඟ θ කෝණයක් සාදයි නම්, යාන්ත්‍රික ශක්ති සංස්ථිති මූලධර්මය උපයෝගී කර ගෙන, තන්තුව නො බුරුල් ව පැවතුනහොත්,

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{g}{a(1+k)}(\sin\theta + k\cos\theta)$$

බව පෙන්වන්න. $0 \leqslant \theta < \frac{\pi}{4}$ විට පමණක් ඉහත සමීකරණය වලංගු වන බව අපෝහනය කරන්න.

P අංශුව මත ප්‍රතික්‍රියාව සොයන්න. $k > 3 - 2\sqrt{2}$ නම් තන්තුව බුරුල් වීමට පෙර ප්‍රතික්‍රියාවේ දිශාව වෙනස් වන බව පෙන්වන්න.

12. ස්කන්ධය m ද පැත්තක් $2a$ ද වන $ABCD$ ඒකාකාර සමචතුරස්‍ර තහඩුවක, AB දරය වටා අවස්ථිති සූර්ණය අනුකලනය කිරීමෙන් සොයන්න.

තහඩුවේ කේන්ද්‍රය හරහා එහි තලයට ලම්බ අක්ෂයක් වටා තහඩුවේ අවස්ථිති සූර්ණය $\frac{2}{3}ma^2$ බව අපෝහනය කරන්න.

තහඩුව, සිරස් ලෙස අචල ව ඇති ඉහත සඳහන් අක්ෂය වටා Ω කෝණික වේගයෙකින් නිදහසේ භ්‍රමණය වෙයි. $\frac{2}{3}m$ ස්කන්ධයෙන් යුත් ස්ථාවර අංශුවක් තහඩුවේ A මුල්ල හා ගැටී තහඩුවේ ඇළෙයි. ඉන්පසු තහඩුවේ ඇති වන කෝණික වේගය සොයන්න. ගැටුම නිසා සිදු වන චාලක ශක්තියේ හානිය $\frac{2}{9}ma^2\Omega^2$ බව පෙන්වන්න.